# 【024】胃癌

# ●レジメン名称:【SP療法(超SH)】

レジメン番号:024-0001

診療科		器内科																	
適応	胃	癌								投 <i>!</i>	テ日利	呈( F	日)						
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	?	22	~	35
S-1		内服	タ	$\rightarrow$	朝														
シスプラチン	60 mg/m2	点滴/2時間								$\downarrow$									

#### ●レジメン名称:【外来S-1+CDDP+HER】

レジメン番号:024-0002

診療科		器内科																	
適応	胃	癌								投 <i>!</i>	テ日利	呈( F	3)						
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	?	21
S-1		内服	タ	$\rightarrow$	朝														
トラスツズマブ	8→6 mg/kg	点滴/90→60分	$\downarrow$																
シスプラチン	60 mg/m2	点滴/2時間	$\downarrow$																

<sup>※</sup>トラスツズマブは、初回は8mg/kgで90分、2回目以降は6mg/kgで60分で投与する。

# ●レジメン名称:【XP療法(超SH)】

レジメン番号:024-0003

診療科		器内科																	
適応	胃	癌								投与	5日和	程(F	<b>∃</b> )						
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	$\sim$	21
カペシタビン		内服	タ	$\rightarrow$	朝														
シスプラチン	80 mg/m2	点滴/2時間								$\downarrow$									

## ●レジメン名称:【HER + SOX】

レジメン番号:024-0004

診療科	消化																	
適応	胃	癌								投 <i><sup>5</sup></i>	テ日利	呈( F	3)					
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	~ 21
S-1		内服	夕	$\rightarrow$	$\rightarrow$	$\rightarrow$	$\rightarrow$	$\rightarrow$	$\rightarrow$	$\rightarrow$	朝							
トラスツズマブ	8→6 mg/kg	点滴/90→60分	$\downarrow$															
オキサリプラチン	100 mg/m2	点滴/2時間	$\downarrow$															

<sup>※</sup>トラスツズマブは、初回は8mg/kgで90分、2回目以降は6mg/kgで60分で投与する。

# ●レジメン名称:【外来胃がんSOX】

レジメン番号:024-0005

			_															
診療科		<b>器内科</b>																
適応	胃	癌								投 <i>与</i>	5日和	涅(E	3)					
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	~ 21
S-1		内服	タ	$\rightarrow$	朝													
オキサリプラチン	100 mg/m2	点滴/2時間	$\downarrow$															

#### ●レジメン名称:【XELOX】

レジメン番号:024-0006

診療科	消化器	<b>器内科</b>																
適応	胃	癌								投 <i>与</i>	5日和	呈( l	日)					
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	~ 2
カペシタビン		内服	タ	$\rightarrow$	朝													
オキサリプラチン	130 mg/m2	点滴/2時間																

#### ●レジメン名称:【ドセ・TS-1】

レジメン番号:024-0007

診療科	消化器	器内科																
適応	胃	癌								投与	5日和	呈(日)						
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 1	12	13	14	15	~	21

S-1		内服	タ	$\rightarrow$	朝													
ドセタキセル	40 mg/m2	点滴/1時間	$\downarrow$															

# ●レジメン名称: 【ラムシルマブ + パクリタキセル】

レジメン番号:024-0008

	診療科	消化器	器内科	]																
	適応	胃	癌								投 <i>与</i>	子日有	涅(E	1)						
	薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	~	28
ラ	ムシルマブ	8 mg/kg	点滴/1時間															<b>1</b>		
パク	フリタキセル	80 mg/m2	点滴/1時間	$\downarrow$							$\downarrow$							$\downarrow$		

#### ●レジメン名称:【ラムシルマブ単剤】

レジメン番号: 024-0009

診療科	消化器	器内科																	
適応	適応 胃癌									投与	扫	涅(日	)						
薬剤名		投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	7	egthinspace =  egt	$\overline{}$
ラムシルマブ	8 mg/kg	点滴/1時間	$\parallel \downarrow$															/	$\overline{}$

#### ●レジメン名称:【CPT-11単剤】

レジメン番号:024-0010

診療科	月16名	器内科	]																
適応	胃	癌	投与日程(日)																
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
イリノテカン	150 mg/m2	点滴/90分	↓															$\overline{/}$	$\overline{\ \ }$

#### ●レジメン名称:【腫瘍内科Docetaxel単剤】

レジメン番号:024-0011

	診療科	消化器	<b>器内科</b>																	
Г	適応	胃	癌								<u>投</u> 与	开日和	呈(日	l )						
	薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	~	21
Г	ドセタキセル	60 mg/m2	点滴/1時間	$\parallel \downarrow$																

## ●レジメン名称:【weeklyPTX + HER】

レジメン番号:024-0012

診療科	消化器	器内科																
適応	胃	癌								投 <i><sup>5</sup></i>	テロネ	程(E	<b>∃</b> )					
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	~ 2	11/1
トラスツズマブ	8→6 mg/kg	点滴/90→60分	$\parallel\downarrow$															$\overline{}$

<sup>※</sup>トラスツズマブは、3週毎(21日/コース)で繰り返す。

※トラスツズマブは、初回は8mg/kgで90分、2回目以降は6mg/kgで60分で投与する。

										投与	5日和	星(F	3)						
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	~	28
パクリタキセル	80 mg/m2	点滴/1時間	$\downarrow$							$\downarrow$							$\downarrow$		

<sup>※</sup>パクリタキセルは、3投1休(28日/コース)で繰り返す。

#### ●レジメン名称:【weekly PTX】

レジメン番号:024-0013

診療科	1、白化多	器内科															
適応	胃	癌	投与日程(日)														
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 11	12	13	14	15 ~	28
パクリタキセル	80 mg/m2	点滴/1時間	$\parallel \downarrow$							$\overline{\downarrow}$						$\downarrow$	

# ●レジメン名称:【Nivolumab 240mg】

レジメン番号:024-0014

<u> </u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		_																
診療科		<b>器内科</b>																	
適応	胃	癌							ŧ	没与	₹日₹	涅(E	4)						
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	Z	乙	/
ニボルマブ	240 mg	点滴/30分	$\downarrow$															/	$\overline{}$

#### ●レジメン名称:【HER + XP(超ショートハイドレーション)】

レジメン番号:024-0015

診療科		<b>器内科</b>																	
適応	胃	癌								投 <i>!</i>	テ日利	呈( F	∃)						
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	~	21
カペシタビン		内服	タ	$\rightarrow$	朝														
トラスツズマブ	8 → 6 mg	点滴/90→60分	$\downarrow$																
シスプラチン	80 mg/m2	点滴/2時間	$\downarrow$																

<sup>※</sup>トラスツズマブは、初回は8mg/kgで90分、2回目以降は6mg/kgで60分で投与する。

#### ●レジメン名称:【Nivolumab 480mg】

レジメン番号:024-0016

200929

診療科	月 1112年	器内科																	
適応	胃	癌								投 <i>与</i>	テ日利	呈(E	<b>3</b> )						
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	~	28
ニボルマブ	480 mg	点滴/30分	$\parallel\downarrow$																

# ●レジメン名称:【ラムシルマブ + アブラキサン】

レジメン番号:024-0017

210428

診療科	ָרַ <u>.</u>	器内科																	
適応	胃	癌								投 <i>与</i>	5日	涅(日)							
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 1	1 1	12	13	14	15	~	28
ラムシルマブ	8 mg/kg	点滴/1時間	$\downarrow$														1		
パクリタキセルアルブミン懸濁液	100 mg/m2	点滴/30分	$\downarrow$							$\downarrow$							$\downarrow$		

#### ●レジメン名称:【RAM + CPT-11】

レジメン番号:024-0018

210812

診療科	消化器	器内科																	
適応	胃	癌								投与	7日和	呈(E	3)						
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	乙	$\angle$	>
ラムシルマブ	8 mg/kg	点滴/1時間	$\parallel\downarrow$													丁	Ζ,	7	$\nearrow$
イリノテカン	150 mg/m2	点滴/90分	↓														/,	/	$\nearrow$

#### ●レジメン名称: 【Nivolumab + SOX】

レジメン番号:024-0019

211208

診療科		器内科																
適応	町	癌								投 <i>!</i>	5日和	程(E	日)					
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	~ 21
S-1		内服	タ	$\rightarrow$	朝													
ニボルマブ	360 mg	点滴/30分	↓															
オキサリプラチン	130 mg/m2	点滴/2時間	$\downarrow$															

#### ●レジメン名称: 【Nivolumab + XELOX】

レジメン番号:024-0020

211208

診療科		<b>器内科</b>																	
適応	胃	癌								投 <i><sup>5</sup></i>	テ日利	呈(E	∃)						
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	~	21
カペシタビン		内服	タ	$\rightarrow$	$\rightarrow$	$\rightarrow$	$\rightarrow$	$\rightarrow$	$\rightarrow$	$\rightarrow$	朝								
ニボルマブ	360 mg	点滴/30分	$\downarrow$																
オキサリプラチン	130 mg/m2	点滴/2時間																	

## ●レジメン名称:【Nivolumab + mFOLFOX6】

レジメン番号:024-0021

211208

	診療科	消化器	器内科															
	適応	胃	癌								投与	扫	程(日)					
	薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 11	12	13 14		otal	otag
	ニボルマブ	240 mg	点滴/30分	$\ \downarrow$												$\overline{Z}$	<i></i>	$\nearrow$
オ	キサリプラチン	85 mg/m2	点滴/2時間	$\downarrow$												Z	Z	Z

レボホリナート	200 mg/m2	点滴/2時間	↓	$\overline{Z}$	$\overline{/}$	$\overline{}$
フルオロウラシル	400 mg/m2	点滴/5分	$\downarrow$	Z	$\angle$	$\angle$
フルオロウラシル	2400 mg/m2	点滴/46時間	$\downarrow$ $\rightarrow$	Z	$\overline{Z}$	$\overline{Z}$

#### ●レジメン名称:【S1】 レジメン番号:024-0022

<u>レンハン田 7.027 0</u>	UZZ		_														
診療科	消化	:器内科															
適応		胃癌						ŧ.	9	- 日和	呈(42	2日)					
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	<b>~</b>	14	<b>\</b>	28	29	~	٧	42

内服

※ 2週間服用1週間休薬の場合もあり(21日サイクル)

# ●レジメン名称:【トリフルリジン・チピラシル(TAS-102)】

80~120 mg

レジメン番号:024-0023

診療科	月16名																	
適応	胃癌								投.	与E	∃程(	28 E	1)					
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	~	28
TAS-102	70~150mg/日	内服	0	$\rightarrow$	$\rightarrow$	$\rightarrow$	$\rightarrow$			0	$\rightarrow$	$\rightarrow$	$\rightarrow$	$\rightarrow$				

# ●レジメン名称:【ゾルベツキシマブ + mFOLFOX6】

レジメン番号:024-0024

診療科	消化器	器内科															
適応	胃	癌							投-	与日	程(	14日	)				
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
ゾルベツキシマブ	· · · · · · · · · · · · · · · · ·	点滴/4時間															$\angle$
オキサリプラチン	85 mg/m2	点滴/2時間	$\downarrow$														$ \mathbb{Z} $
レボホリナート	200 mg/m2	点滴/2時間	$\downarrow$														$\overline{}$
フルオロウラシル	400 mg/m2	点滴/5分	$\downarrow$														>
フルオロウラシル	2400 mg/m2	点滴/46時間	$\downarrow$	$\rightarrow$													$\overline{Z}$

## ●レジメン名称:【ゾルベツキシマブ + CAPOX】

レジメン番号:024-0025

<u> </u>			_															
診療科		<b>器内科</b>																
適応	胃	癌							招	设与	日程	(21	日)					
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 ~	· 21
カペシタビン		内服	タ	$\rightarrow$	朝													
ゾルベツキシマブ	800→600mg/m <sup>2</sup>	点滴/4時間	$\downarrow$															
オキサリプラチン	130 mg/m2	点滴/2時間																

#### ●レジメン名称:【Pembrolizumab + CAPOX】

レジメン番号:024-0026

20240807

診療科	消化器																	
適応	胃	癌								投 <i>!</i>	5日和	涅(E	3)					
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	~ 21
カペシタビン		内服	タ	$\rightarrow$	朝													
ペムブロリズマブ	200 mg	点滴/30分	$\downarrow$															
オキサリプラチン	130 mg/m2	点滴/2時間	$\downarrow$															

#### ●レジメン名称:【Pembrolizumab + FP】

レジメン番号:024-0027

20240807

診療科	消化器内科 原癌																		
適応	胃癌 用癌 机上型									投-	与E	]程(	日)						
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	~	21
ペムブロリズマブ	200 mg	点滴/30分	$\ \downarrow$																
フルオロウラシル	800 mg/m2	点滴/24時間	$\downarrow$	$\downarrow$	$\downarrow$	$\downarrow$	$\downarrow$												
シスプラチン	80 mg/m2	点滴/2時間	$   \downarrow  $																

# ●レジメン名称:【Pembrolizumab + SOX】 レジメン番号: 024-0028

20240807

診療科	消化器	消化器内科 用痕																	
適応	胃	胃癌 								投 <i>!</i>	5日和	呈( F	<del>]</del> )						٦
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	~ 2	1
S-1		内服	タ	$\rightarrow$	$\rightarrow$	$\rightarrow$	$\rightarrow$	朝		٦									
ペムブロリズマブ	200 mg	点滴/30分	↓																
オキサリプラチン	130 mg/m2	点滴/2時間																	