

【014】悪性リンパ腫

●レジメン名称:【R-CHOP(非ホジキンリンパ腫)】

レジメン番号:014-0001

| 診療科 | 消化器内科 | | 投与日程(日) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|------------------------|--------|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|---|----|--|
| 適応 | 非ホジキンリンパ腫 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 薬剤名 | 投与量 | 投与方法 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ~ | 21 | |
| リツキシマブ | 37.5 mL/m ² | 点滴 | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ドキシソルビシン | 50 mg/m ² | 点滴/5分 | | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ビンクリスチン | 1.4 mg/m ² | 点滴/5分 | | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| シクロホスファミド | 750 mg/m ² | 点滴/2時間 | | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | |

※リツキシマブの投与速度は、初回25mL/hr、2回目100mL/hr、3回目以降200mL/hr

※ビンクリスチンの投与量の上限は、2mg/body

●レジメン名称:【R-CHOP】

レジメン番号:014-0002

| 診療科 | 消化器内科 | | 投与日程(日) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|------------------------|--------|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|---|----|--|
| 適応 | 悪性リンパ腫 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 薬剤名 | 投与量 | 投与方法 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ~ | 21 | |
| リツキシマブ | 37.5 mL/m ² | 点滴 | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| シクロホスファミド | 750 mg/m ² | 点滴/2時間 | | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ドキシソルビシン | 50 mg/m ² | 点滴/30分 | | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ビンクリスチン | 1.4 mg/m ² | 静注/5分 | | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | |

※リツキシマブの投与速度は、初回25mL/hr、2回目100mL/hr、3回目以降200mL/hr

※ビンクリスチンの投与量の上限は、2mg/body